

PLOCHER-Vitaalplan: Weide & Grasland



Gebruiks-advies	PLOCHER-PRODUKTEN	Te gebruiken hoeveelheden	Opmerkingen
Begin in het voorjaar om het Bodemleven te activeren. Verdere toepassingen; Na het omwoelen-fresen/ snijden-oogsten / mulchen, composteren van de rest- materialen	plocher Bodemleven activator/Katalysator me <i>ak 7061 2 l, ak 7071 10 l</i>	500 ml - 1 Liter/ha <i>Bij Bodemsanering: 2 l/ha</i> <i>Op kleine oppervlaktes</i> <i>10 - 50 ml pro 100 m²</i>	<i>Gielen in de tank, voordat je het vult met water. (kleinere oppervl. sprayen met bijv. rugspuit).</i> <i>- niet op bevroren grond</i> <i>- het beste net voor de regenval</i>
Ongeveer 2 weken later op het hergroeiende gras om fotosynthese te bevorderen	plocher planten do/me <i>ap 3041 2 kg, ap 3051 10 kg</i> <i>ap 3061 2 l, ap 3071 10 l</i> plocher blad-speciaal me <i>ap 3461 2 l, ap 3471 10 l</i>	200 g ml/ha 100 ml/ha	<i>Voor in de veldspuit (kleinere oppervlakken bijv. Met een rugsproeier) beide in water roeren.</i> <i>Spray bij droog weer.</i> Spray-water hoeveelheid: 200 - 400 l/ha

Voor bemesting: mest intensief gecomposteerd met Composteer Katalysator (40 g / m³)

Conclusie: geoptimaliseerde wortelgroei, bevordering van fotosynthese, hoogwaardig, smakelijk basisvoer en een slijtvaste grasmat

Compostbemesting alleen tijdens het groeiseizoen, in het vroege voorjaar (vanaf ca. 7 °C bodemtemperatuur), dus niet op bevroren grond.

De rijke compostbiologie is belangrijk voor de snelle implementatie en de opbouw van humus in de bodem. Alternatief of aanvullend zorgt de compost voor een verdere goede groei in de zomer.

Kosten

